

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ГомельФарм»
_____ О.Н. Седой
«4» апреля 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОБАВКА КОРМОВАЯ ПОДКИСЛЯЮЩАЯ «ЛАКТОФОР»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Лактофор (Lactoforum) представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым характерным кислотным запахом.
- 1.2 В 1,0 л содержится 8,0% муравьиной кислоты и 16,0% молочной кислоты. Общая кислотность добавки 15% (в перерасчете на соляную кислоту).
- 1.3 Добавку фасуют в бутылки из полимерного материала по 1,0 дм³ или в канистры из полимерного материала по 5, 10, 20 дм³.
- 1.4 Хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от 0⁰С до плюс 35⁰С. Срок годности добавки 3 (три) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 СВОЙСТВА

- 2.1 Органические кислоты, входящие в состав добавки «Лактофор» способствуют формированию в кишечнике благоприятной микрофлоры, улучшают здоровье, снижают смертность, повышают прирост массы сельскохозяйственных животных и птицы, снижают затраты кормов; предотвращают образование сгустков казеина в желудке у телят.
- Муравьиная кислота** - самая сильная алифатическая кислота, обладает прямым антимикробным действием (в концентрации 500 мг/л снижает титр микроорганизмов до 10 кл/г).
- Молочная кислота** - активизирует выделение пищеварительных ферментов в кишечный тракт и стимулирует их действие. Молочная кислота способствует повышению усвоения фосфора и кальция организмом.
- 2.2 Молочная и муравьиная кислоты являются естественными метаболитами обмена веществ в организме животных и птицы и играют важную роль в обеспечении энергией.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Птице:

- для снижения бактериальной обсемененности питьевой воды и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Добавку применяют в дозе 3 л на 1000 л питьевой воды.

3.2 Телятам молозивного и молочного периода выращивания:

- для профилактики неонатальных диарей; профилактики казеинобезоарной болезни новорожденных телят; как профилактическое средство при неспецифической и аутоиммунной диарее; молозивном токсикозе; для предупреждения контаминации условно-патогенной микрофлоры в пищеварительном тракте у телят до 10 дневного возраста.

Добавку задают внутрь с молоком из расчета 10-15 мл на 1 л молока или по 5-10 мл на 1 л молозива при каждом кормлении.

3.3 Лактофор совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. При соблюдении условий применения не оказывает на организм побочного действия.

3.4 Продукция животноводства, полученная от животных и птицы, которым применяли добавку, используется без ограничений

4 МЕРЫ ПРЕДУСТОРОЖНОСТИ

4.1 При применении добавки соблюдать правила техники безопасности при работе с кислотосодержащими веществами, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Хранить в местах, недоступных детям.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения добавки, ее использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении отрицательного воздействия добавки на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17). Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56, 8 (0232) 26-36-29.